

## PERMACOL 16.2

Insetticida concentrato in microemulsione acquosa, privo di solventi, ad azione abbattente e residuale. A base di permetrina e tetrametrina sinergizzate con PBO. Per uso domestico e civile.

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Permetrina 93% min. (Cis/trans = 25/75)	g	16,13 (172,2 g/l)
Tetrametrina 92% min.	g	2,17 (23,4 g/l)
Piperonilbutossido 94% min.	g	10,64 (114,9 g/l)
Coformulanti e acqua	q.b. a g	100



### IL PRINCIPIO ATTIVO

PERMACOL 16.2 è un insetticida formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con azione abbattente ed elevata persistenza. L'assenza di solventi rende il PERMACOL 16.2 inodore e non infiammabile.

PERMACOL 16.2 è composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad azione letale, e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante, sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dal Piperonil Butossido.

### I PARASSITI

PERMACOL 16.2 è un insetticida attivo contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche (*Musca domestica*, moscone della carne, mosca cavallina), zanzare (genere *Culex Pipiens*, *Aedes*), flebotomi, vespe (*Vespula spp*) e striscianti tra cui blatte (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, *Periplaneta Americana*) e zecche (*Ixodes ricinus*).

### L'APPLICAZIONE

PERMACOL 16.2 è indicato per ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili, che rurali e industriali: ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi. L'uso è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi, viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi, in quanto alle concentrazioni d'uso non risulta fitotossico.

- Contro insetti volanti per trattamenti in interni: diluire 80-120 ml in 10 l di acqua (0,8-1,2 %).

La soluzione insetticida va nebulizzata nell'area ambiente in ragione di 1 l per 500 mc.

- Contro insetti striscianti per trattamenti in interni: diluire 150-200 ml in 10 l di acqua (1,5-2 %).

La soluzione insetticida va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 l per ogni 20 mq.

- Trattamenti all'esterno: la soluzione insetticida va diluita in ragione di 400-800 ml in 100 l di acqua (0,4-0,8 %) utilizzando atomizzatori a medio-basso volume in ragione di 100 l per 10.000 mq di superficie.

- Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni: utilizzare 100 ml di prodotto in 900 ml di glicole propilenico o idoneo solvente. La soluzione va impiegata mediamente per 3.500 mc.

### LE QUALITÀ

Le caratteristiche dei principi attivi conferiscono a questo formulato un TRIPLICE EFFETTO: STANANTE, ABBATTENTE e RESIDUALE.

### LE INDICAZIONI

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.

Ulteriori importanti informazioni inerenti il prodotto sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non applicare il prodotto direttamente sulle sostanze alimentari, sui mangimi e sulle superfici dove gli alimenti vengono preparati, mangiati o conservati.

Poiché Colkim non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzazione dello stesso.

Presidio Medico - Chirurgico. Uso civile e domestico.  
Registrazione Ministero della Salute n. 19856



ATTENZIONE



ATTENZIONE

SCT-00320